

Polvilho Antisséptico Granado Fresh
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

ácido salicílico - 0,352 g

enxofre - 17,602 g

ácido bórico - 3,0 g

óxido de zinco - 11,735 g

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

Nome comercial:

POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO FRESH

Denominação genérica dos princípios ativos:

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO

Composição

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3,0 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos.

Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde. Este medicamento não deve ser usado em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:

M.S. 1.0817.0030.0041

Farmacêutico Responsável: LUCIANA CHAVES TOURINHO - CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0004-60

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri - RJ

